

## Klassifikation der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) nach Fontaine und Rutherford

| Fontaine    |   | Rutherford |           |                                  |
|-------------|---|------------|-----------|----------------------------------|
| Stadium     | Klinisches Bild   | Grad       | Kategorie | Klinisches Bild                  |
| <b>I</b>    | Beschwerdefreiheit bei objektiv nachgewiesener PAVK               | 0          | 0         | Asymptomatisch                   |
| <b>II a</b> | Claudicatio intermittens mit einer freien Gehstrecke $\geq$ 200 m | I          | 1         | Leichte Claudicatio intermittens |
| <b>II b</b> | Claudicatio intermittens mit einer freien Gehstrecke $<$ 200 m    | I          | 2         | Mäßige Claudicatio intermittens  |
|             |   | I          | 3         | Schwere Claudicatio intermittens |
| <b>III</b>  | Ischämischer Ruheschmerz (Ruhe- und Nachtschmerzen)               | II         | 4         | Ischämischer Ruheschmerz         |
| <b>IV</b>   | Nekrose/Gangrän/Ulcus   | III        | 5         | Kleinflächige Nekrose            |
|             |   | III        | 6         | Großflächige Nekrose             |